

NA LARWY

DDD-1®
NAJLEPSZA DEZYNFEKCJA

Preparat do zwalczania larw owadów uciążliwych granulat rozpuszczalny w wodzie

Skład: Cyromazyna SG 2%, Nr CAS 66215-27-8

Nośnik obojętny 98%

Hoko-ex nr. rej: 2085/05 z 01.02.2005r.

Środki ostrożności: Uwaga! Nie spożywać.

Środek szkodliwy dla ludzi i zwierząt.

Spożycie produktu może być szczególnie niebezpieczne dla przeżuwaczy.

Przed rozpoczęciem stosowania preparatu zapoznać się z treścią etykiety i ściśle jej przestrzegać!

ZASTOSOWANIE: Środek przeznaczony jest do zwalczania larw owad uciążliwych w chlewniach, kurnikach, stajniach, oborach, cielętnikach.

Preparat jest wskazany szczególnie tam, gdzie zawodzą tradycyjne środki owadobójcze.

SPOSÓB DZIAŁANIA: Środek o właściwościach larwobójczych, który nie pozwala na przepoczwarczenie się larw.

SPOSÓB UŻYCIA: Produkt należy stosować w odstępach 6 tygodniowych. Również wtedy, gdy zwierzęta są w boksach.

Dozowanie wynosi zawsze 250 g preparatu na 10m² powierzchni objętej działaniem produktu suchego, którym posypujemy powierzchnię, albo spryskujemy powierzchnię z opryskiwacza plecakowego wypełnionego produktem rozpuszczonym w 1-4 l wody, ewentualnie polewamy powierzchnię produktem rozpuszczonym w 10 l wody.

OPRYSK

DAWKA	ILOŚĆ WODY	POWIERZCHNIA
250 g	“0”L na sucho	10 m ²
	1L	
	2L	
	3L	
	4L	

POLEWANIE

DAWKA	ILOŚĆ WODY	POWIERZCHNIA
250 g	10L	10 m ²

Jednoczesne użycie insektycydu przeciw formom dorosłym pozwala na wydłużenie odstępu czasu pomiędzy kolejnym stosowaniem produktu.

CHLEWNIE I OBORY - należy stosować produkt wzdłuż ścian, obok i pod instalacjami, spryskując z opryskiwacza plecakowego lub polewając z polewaczki, partie szerokości ok. 50 cm wzdłuż ścian, w miejscu nagromadzonej podściółki. W przypadku odchodów płynnych, produkt może być rozsypywany.

W pomieszczeniach z kanałami odprowadzającymi obornik i gnojowicę, preparat należy stosować na całej powierzchni.

Korzystne jest zastosowanie produktu przed wprowadzeniem zwierząt, po usunięciu obornika lub po odprowadzeniu gnojówki.

KURNIKI - produkt należy stosować poprzez polewanie lub oprysk na suchą ściółkę, w przypadku miejsc mocno zawilgoconych (mokrych) produkt należy stosować na sucho. Produkt stosować wzdłuż ścian, linii pojenia i karmienia.

Orientacyjna dawka na kurnik o powierzchni 1000m² to 15 kg preparatu NA LARWY.

**250 g preparatu NA LARWY
wystarcza na 10 m² powierzchni**

Zapraszamy na nasze strony internetowe:

www.DezynfekcjaChlewni.pl

www.DezynfekcjaKurnika.pl

www.ZwalczaniePleśniakowca.pl